

RI検査一覧表

検査名		使用する薬品名	投与方法	投与してから撮影を開始する時間	検査時間	前処置及び注意事項
骨シンチ		クリアボーン/Tc-MDP	静注	3～5時間後	30分～60分	10時に注射、午後に撮影。撮影時間の直前に排尿。
心筋シンチ	心筋血流+心筋脂肪酸	TICI + I-123BMIPP	静注	15分後	30分	検査前4時間絶食
	心筋交感神経機能(MIBG)	I-123MIBG	静注	15分後と3時間後	各30分	3環系抗うつ剤は、一週間前から投与中止。
脳血流シンチ		I-123IMP/Tc-ECD	ボース静注	直後	60分	制限なし
脳DAT		ダットスキャン静注	静注	3～5時間後	60分	10時に注射、午後に撮影。 <b>注1)検査に影響のある薬剤は休薬推奨</b>
腎動態シンチ(薬剤負荷なし)		Tc-MAG3	ボース静注	直後	30分	制限なし
唾液腺シンチ		TcO4-	ボース静注	直後	60分	検査前1時間絶食。レモン又は梅干が必要。患者持参。
甲状腺形態(Tc)シンチ		TcO4-	静注	15分後	30分	制限なし

注1)  
 選択的セロトニン再取り込み阻害薬  
 ・塩酸セルトラリン 6日  
 ・フルボキサミンマレイン酸塩 5日  
 ・パロキセチン塩酸塩水和物 5日  
 食欲抑制剤  
 ・マジンドール 3日  
 中枢興奮剤  
 ・メタンフェタミン塩酸塩 3日  
 中枢神経刺激薬  
 ・メチルフェニデート塩酸塩 2日  
 コカイン系製剤  
 ・コカイン塩酸塩 2日  
 三環系抗うつ剤  
 ・アモキサピン 記載なし